

تُعد الأسباب الدقيقة للإصابة بسرطان البنكرياس غير معروفة ولكن
يمكن لبعض العوامل أن تزيد من خطر إصابتك

تُزيد السمنة من خطر الإصابة
بحوالي **12%** من جميع
سرطانات البنكرياس.

يكون الأشخاص الذين لديهم اثنين
على الأقل من أقارب الدرجة الأولى*
الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان
البنكرياس عُرضة لخطر الإصابة بمقدار
الضعف تقريباً

*الأم والأب والأخ أو الأخت

يتضاعف خطر إصابة
الأشخاص الذين يعانون من
منمرض السكري بيسرطان
البنكرياس.

الأمراض الأخرى
المرتبطة بتزايد الخطر:

- التهاب البنكرياس المزمن
- مرض التهاب دواعم السن
- مرض كرون
- السرطانات السابقة

تشير التقديرات إلى أن التدخين
يسبب **22%** من سرطانات
البنكرياس في المملكة المتحدة.
قد ينخفض مقدار الخطر الذي
تواجهه إلى ذلك المقدار الذي يواجهه
غير المدخن بعد توقفك عن التدخين
لمدة خمس سنوات أو أكثر.

47% من الحالات الجديدة
التي تم تشخيصها
أعمارهم فوق سن 75 سنة.

إنقاذ الأرواح من خلال التشخيص المبكر