

# Czynniki ryzyka przeciwko rakowi trzustki

pancreatic  
cancer  
**action**

Dokładne przyczyny nowotworu trzustki są nieznane, jednak niektóre czynniki mogą **podwyższać ryzyko zachorowania**.



**Osoby, które posiadają co najmniej dwóch krewnych pierwszego stopnia\*** ze zdiagnozowanym rakiem trzustki, są **narażone na prawie dwukrotnie większe ryzyko**.

\*Matka, ojciec, brat lub siostrat



**Otyłość podwyższa ryzyko** wszystkich nowotworów trzustki o około **12%**.


**2x**

Osoby na cierpiące na **cukrzycę** są narażone na **podwójne ryzyko** nowotworu trzustki.



**Inne choroby, które są związane z podwyższonym ryzykiem:**

- Przewlekłe zapalenie trzustki
- Choroby dziąseł
- Choroba Leśniowskiego-Crohna
- Poprzednio przebyty nowotwór



Szacuje się, że w **Wielkiej Brytanii palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka trzustki o 22%**.

Po zaprzestaniu palenia ryzyko może zostać zmniejszone do poziomu osoby niepalącej w ciągu pięciu lub więcej lat.

**47%**

**47% nowych zachorowań** rozpoznawanych jest **u osób w wieku powyżej 75 lat**.

Ratowanie życia poprzez wczesną diagnozę

[panact.org](https://panact.org) 0303 040 1770

Zaufane  
źródło  
informacji



Patient Information Forum